


แนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS โรงพยาบาลศิริราช



- Airway** ➤ หากผู้ป่วยซึมมาก ต้อง maintain airway ด้วย endotracheal tube
- Breathing** ➤ หากมีภาวะ impending respiratory failure ไม่ว่าจะเป็ ventilation หรือ oxygenation failure ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- Circulation** ➤ ต้องทำให้ภาวะ hypotension และ hypoperfusion ดีขึ้น โดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด organ dysfunction ตามมา โดยการทำให้ hemodynamic resuscitation อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายใน 6 ชม.
- Delivery of oxygen** ➤ ระดับ Hct เพียงพอ สามารถพา O₂ ไปสู่อวัยวะได้มากที่สุด



- เริ่มต้นให้ NSS 500-1000 ml ใน 1/2 ชม. แรก (ลดอัตราการลงในผู้ป่วยสูงอายุ/ โรคหัวใจ) เมื่อไม่ดีขึ้นให้ซ้ำได้อีก โดยทั่วไป fluid Requirement 30 ml/kg ใน 3 ชั่วโมงแรก
- พิจารณาทำ central line เมื่อให้ IV ทาง peripheral 2 ลิตร แล้ว BP ยังไม่ stable หรือไม่แน่ใจว่า fluid ที่ให้เหมาะสมหรือไม่
- ทำ fluid challenge test หลังทำ central line เมื่อ BP stable แล้วต้อง maintenance fluid ด้วยเสมอ

